HoneyLab Teper & Waś s.c.
ul. gen. Fieldorfa Nila 18/9
24-100 Puławy
tel. 608 466 908
e-mail: dariusz.teper@honeylab.pl, www.honeylab.pl

Sprawozdanie z badań nr 724/03/26

Zleceniodawca: **Kamil Dryzek, ul. Leśna 22, 97-400 Bełchatów**	
Data przyjęcia próbki do laboratorium	**14.07.2026**
Nr Zlecenia	**724/26 z dnia 12.07.2026**
Data wykonania badań	**07-08.09.2026**
Data opracowania Sprawozdania z badań	**08.09.2026**

Informacje dotyczące badanej próbki miodu	
Kod próbki w laboratorium	**724/03/26**
Opis próbki	**Próbka 100 g, płynna, mętna, żółtej barwy**
Oznaczenie próbki nadane przez Klienta	**Próbka 3**
Inne informacje uzyskane od Klienta	**01-07-2026**

Wyniki badań

Metoda badań: Metoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. VI.
Wartość normatywna wg PN-88/A-77626 „Miód pszczeli”: Opis poniżej.

l.p.	Typy pyłku roślin nektarodajnych	Średnia suma ziaren pyłku z 2 analiz	Procentowy udział pyłku
1	Brassica napus - rzepak (prawd. część pyłku z pierzgi)	261,5	68
2	Phacelia - facelia	31,5	8
3	Salix - wierzba	22,0	6
4	Rubus typ - typ maliny	19,5	5
5	Prunus typ - typ śliwy	16,0	4
6	Acer - klon	9,5	2
7	Aesculus - kasztanowiec	7,0	2
8	Centaurea cyanus - chaber bławatek	4,5	1
9	Inne	14,0	4
	Razem	385,5	100
Identyfikacja miodu: interpretacja poniżej			

Opinia i interpretacja:

Wynik analizy pyłkowej badanej próbki, nie może jednoznacznie decydować o klasyfikacji miodu do odmiany, gdyż w miodzie stwierdzono wtórne doprószenie pyłkiem rzepaku z pierzgi. Należy podkreślić, że analiza pyłkowa jest tylko „narzędziem” do oszacowania składu nektarowego miodu na podstawie procentowej zawartości pyłku roślin, który trafił do miodu razem z nektarem. W przypadku, gdy pyłek przedostał się do miodu inną drogą, np. pochodzi z pierzgi, tak jak w badanej próbce, identyfikacja odmiany miodu na podstawie wyników analizy pyłkowej nie jest możliwa, a decydująca powinna być ocena organoleptyczna (smak, zapach, konsystencja, barwa). W związku z powyższym, mimo iż wynik analizy pyłkowej wskazuje, że pyłek rzepaku występuje w znacznej przewadze, to skład nektarowy badanego miodu jest inny niż wskazuje wynik badania. Niemniej jednak, w naszej opinii, cechy organoleptyczne świadczą o tym, że jest to miód wielokwiatowy.

HoneyLab Teper & Waś s.c.
ul. gen. Fieldorfa Nila 18/9
24-100 Puławy
tel. 608 466 908
e-mail: dariusz.teper@honeylab.pl, www.honeylab.pl

Uwagi:

1. Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.
3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania.
4. Wyniki analizy pyłkowej miodu interpretowane są w odniesieniu do Polskiej Normy – Miód pszczeli (PN-88/A-77626), a w przypadku odmian niewykazanych w PN, na podstawie dostępnej literatury naukowej.
5. Niepewność metody jest podawana na życzenie klienta.
6. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek do badań.

PODPIS ZAUFANY
DARIUSZ
TEPER
08.09.2026 15:41:36 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Sporządził i autoryzował :
Dr Dariusz Teper

----------KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ ----------